

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

NLP 20-10-70 108241

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 121 - OCTOBRE 1970/34

TRAITEMENTS D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

Des traitements d'automne à base de produits fongicides sont nécessaires à l'automne pour assurer le bon état sanitaire de la plupart des arbres fruitiers!

ABRICOTIER et PRUNIER :

Après élimination des productions détruites ou altérées par le Monilia, les arbres atteints par la Rouille recevront une pulvérisation à base d'anticryptogamique de synthèse.

CERISIER :

Outre la Cylindrosporiose (anthracnose) qui semble en extension constante, il convient de combattre également à l'automne les maladies bactériennes; l'infection se produisant à partir des plaies pécuniaires consécutives à la chute des feuilles, il sera utile de traiter à deux reprises (1/3 de la chute des feuilles, puis après la chute totale), à l'aide d'un produit cuprique.

PECHER et AMANDIER :

Le Fusicoccum est désormais assez fréquemment observé. Traiter à deux reprises (début et fin de la défoliation).

Pour le premier traitement utiliser le Captane, le Zirame, le Phaltane, le Thirame.

Pour le second traitement ne recourir aux produits que sur des arbres parfaitement acotés et par temps sec. Ne jamais dépasser la dose préconisée par le fabricant.

POIRIER :

L'automne est propice à l'exécution de traitements efficaces contre la maladie bactérienne, Pseudomonas syringae, qui provoque le flétrissement des boutons floraux, le noircissement des pousses et le dessèchement des poires.

Dans les vergers où la maladie a été constatée exécuter un traitement minutieux par pulvérisation d'une bouillie cuprique ayant une teneur en cuivre métal de 250 g par hectolitre de bouillie.

OLIVIER :

C'est le cycloconium (maladie de l'œil de paon) qui motivera un traitement éventuel des oliviers. Utiliser soit un anticryptogamique de synthèse, soit une bouillie cuprique. Les températures assez élevées qui semblent s'établir après la récente période pluvieuse favoriseront l'évolution de la Mouche de l'olive (Dacus). En conséquence un nouveau traitement se justifiera au cours de la troisième décennie d'octobre.

TIRAGE DU 15 OCTOBRE 1970.

L.L.TROUILLON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

7434